



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Archive ouverte UNIGE

<https://archive-ouverte.unige.ch>

Article scientifique

Article

2024

Appendix

Open Access

This file is a(n) Appendix of:

Hygiene measures and decolonization of *Staphylococcus aureus* made
simple for the pediatric practitioner

Cane, Fabien; Posfay Barbe, Klara; Pittet, Laure

This publication URL:


<https://archive-ouverte.unige.ch/unige:179437>

Publication DOI:


[10.1097/INF.0000000000004294](https://doi.org/10.1097/INF.0000000000004294)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holders for terms of use.

PROTOCOLLO PER LA DECOLONIZZAZIONE DELLO STAFILOCOCCO AUREO



Non iniziare in caso di un'infezione attiva



1/ Misure igieniche

- Unghie **corte** e mani **pulite** lavate con sapone **liquido**
- **Vestiti**, biancheria intima e pigiami **cambiati 1x/die**
- **Lenzuola** cambiate il più spesso possibile, **lavate a 60°C**
- **Non condividere** i prodotti per l'igiene (deodoranti, spazzole)
- **Disinfettare gli oggetti comuni** il più spesso possibile



2/ Doccia : Lifo Scrub ©

- **1x/die per 7 giorni**
- Applicare la **schiuma** e lasciare **agire per 2 minuti**, concentrandosi sulle **pieghe cutanee** (ascelle e inguine).
- Dopo, utilizzare vestiti e biancheria da letto **puliti**



3/ Bocca : DentoHexine garg © o Collunovar spray ©

- **2x/die per 7 giorni**
- Dopo aver lavato i denti **come di consueto**,
 - fare dei **gargarismi** con la soluzione orale
 - o **spruzzare** in bocca
- **Protesi dentarie**: immergere per 30 minuti in una soluzione disinfettante



4/ Naso : Bactroban nasal ©

- **2x/die per 10 giorni**
- Con un cotton fioc pulito per lato, applicare una piccola quantità di pomata nella cavità nasale, massaggiando la narice.

5/ Dopo la decolonizzazione

Continuare ad applicare le misure igieniche elencate al punto 1.



Bambini con pannolini

- **Bagni con candeggina**: 12ml/10L di acqua
- **Piscina**



Orzaiolo ricorrente : Fucithalmic gel oftalmico ©

- **2x/die per 7 giorni**
- Applicare una piccola quantità di gel sul **bulbo oculare**